

Maladie de l'œil de paon – OptiPaon aide à la décision

La maladie de l'œil de paon est le principal problème sanitaire en oléiculture. La lutte contre son développement repose sur des méthodes prophylactiques : taille régulière et aération des frondaisons... et l'application de produits phytosanitaires à base de cuivre. Les produits disponibles sur le marché actuellement permettent de réduire les doses de cuivre utilisées habituellement tout en gardant une protection satisfaisante des oliviers. Pour aider chaque oléiculteur à adapter sa stratégie et définir les traitements nécessaires nous vous conseillons d'utiliser Optipaon.

L'observation régulière de son verger, principalement du pourcentage de feuilles tachées régulièrement est à la base de toutes les stratégies.

Optipaon estime une sensibilité de votre verger à un moment donné

1 – notez les pourcentages de feuilles tachées dans votre verger

2 – connectez-vous sur le site du CIRAME et saisissez les données pour votre verger sur les 6 critères.

http://www.agrometeo.fr/op_oad.asp

3- Optipaon vous donne alors l'indication d'un nombre de traitements compris entre 0 et 5, il s'agit toujours de traitement à la demi-dose de cuivre par rapport à la dose "maximale" homologuée mentionnée sur l'emballage.

Optipaon est un outil d'aide à la décision créé par MM. Serge Régis et Christophe Roubal pour les services du Ministère de l'agriculture après de nombreuses années d'observations.

**Faites le calcul 2 fois par an
notation de printemps en mars et notation d'automne fin aout**

Les périodes de traitements

Reportez vous au tableau ci-dessous pour définir vos périodes de traitement.

★ Traitement à demi-dose de cuivre de **printemps** ☼ Traitement à demi-dose de cuivre de **l'automne**

<i>Optipaon - notation de printemps</i>						<i>Optipaon notation d'automne</i>					
→ 0	Aucun traitement au printemps					→ 0	Aucun traitement à l'automne				
	mars	avril	mai	juin	juil.	→ 1	☼ sept				
→ 1	★					→ 0 ou 1	Aucun traitement à l'automne				
	mars	avril	mai	juin	juil.	→ 2	☼ sept				
→ 2		★				→ 3,4 ou 5	☼ sept	☼ oct			
	mars	avril	mai	juin	juil.	→ 0 ou 1	Aucun traitement à l'automne				
→ 3		★	★	si risque fort		→ 2 ou 3	☼ sept				
	mars	avril	mai	juin	juil.	→ 4 ou 5	☼ aou	☼ sept	☼ oct		
→ 4		★	★			→ 0 ou 1	Aucun traitement à l'automne				
	mars	avril	mai	juin	juil.	→ 2 ou 3	☼ si risque fort uniquement				
→ 5		★	★			→ 4 ou 5	☼ aou	☼ sept	☼ oct	☼ si risque fort uniquement	
	mars	avril	mai	juin	juil.	→ 0,1 ou 2	Aucun traitement à l'automne				
→ 5		★	★	★		→ 3	Aucun traitement à l'automne				
	mars	avril	mai	juin	juil.	→ 4	☼ si risque fort uniquement				
→ 5		★	★			→ 5	☼ sept	☼ oct	☼ si risque fort uniquement		
	mars	avril	mai	juin	juil.	→ 0,1, 2 ou 3	Aucun traitement à l'automne				

Ce tableau indique des périodes types et des positionnements standards qu'il convient d'adapter chaque année à la situation climatique, à vos observations et celles du BSV et aux préconisations d'Infolive.

Pour les détails sur la maladie et la liste de produits homologués reportez vous à la fiche technique « Maladie de l'œil de paon » et le guide de l'oléiculteur sur www.afidol.org