

# INFOLIVE

25

## ENTRETIEN et CULTURE DE L'OLIVIER

BULLETIN n°25 du 9 octobre 2012

**RÉGIONS :** LANGUEDOC-ROUSSILLON  
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR  
RHONE-ALPES

**RÉFÉRENCES :** BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL  
n° 12 du 9 octobre 2012

**DANS CE NUMÉRO :**

- Maturité**  
Ni avance, ni retard pour le moment, la qualité s'annonce bonne.
- Mouche de l'olive**  
Inutile de traiter les olives à huile : préférez récolter tôt !
- Œil de paon**  
Les températures devraient baisser en octobre  
Inutile de renouveler un traitement



*Afidol*

Pensez à consulter  
[www.afidol.org](http://www.afidol.org)

CENTRE TECHNIQUE DE L'OLIVIER

INFOLIVE est une feuille d'information et de préconisation établie par le Centre Technique de l'Olivier pour le compte de l'AFIDOL, à partir du Bulletin de Santé du Végétal Oléiculture. Ce document n'est pas contractuel et les informations données n'ont qu'une valeur indicative. Les informations présentes sur l'étiquette des produits ont valeur de loi.



Région  
PACA



LE DÉPARTEMENT



Travaux financés par l'Union Européenne, FranceAgriMer  
et l'Association Française Interprofessionnelle de l'Olive,  
dans le cadre du règlement européen CE n°867/2008 du 3 septembre 2008 modifié par le Règlement (UE)  
N°1220/2011 du 25 novembre 2011, portant modalités d'application du règlement CE n°1234/2007



FranceAgriMer



L'AFIDOL est une organisation d'opérateurs oléicoles agréée sous le numéro OPEO 2012/01

## ENTRETIEN et CULTURE DE L'OLIVIER

### Suivi de maturité

Les premières analyses d'olives ont été réalisées au cours de la semaine précédente. Dans l'ensemble, **la maturité se présente comme "normale"**, il n'y a pour l'instant pas d'avance particulière.

**Mi-octobre 2012**

Voici ce que nous avons trouvé **suffisamment mûr pour être récolté** :



- Le **Cayon** dans les zones précoces du Var ;
- Le **Cailletier** dans les zones très précoces des Alpes-Maritimes ;
- La **Salonenque** dans les zones très précoces des Bouches-du-Rhône.



Ailleurs, ces variétés ne sont pas encore tout à fait mûres.

Les échantillons **d'Aglandau** traités ne montrent pas une maturité particulièrement avancée.

**La qualité s'annonce très bonne.**

**Les rendements s'annoncent convenables, sur les vergers irrigués.** Sur les parcelles qui ont souffert de la sécheresse pendant l'été, des rendements très bas sont à craindre.

#### La stratégie « Récolte précoce »

Les dégâts sur l'olive sont significatifs à partir du moment où le trou de sortie est réalisé par la larve de 3<sup>ème</sup> stade soit environ 1 mois après la ponte, en automne. Les œufs pondus début octobre ne causeront pas de dégâts avant la fin du mois voire début novembre. On peut donc éviter ces dégâts en récoltant avant la fin octobre.

L'inconvénient du rendement en huile plus faible sera compensé par les avantages que constituent l'économie d'un traitement, la réduction des apports de pesticides, une huile au fruité vert intense.

La stratégie « **Récolte précoce** » est particulièrement adaptée pour une oléiculture biologique ou raisonnée, elle peut compenser l'absence de traitement curatif en agriculture bio, et permettre de supprimer un traitement en agriculture raisonnée.

Le **suivi de maturité** vous permet d'ajuster vos décisions de récolte précoce.

## ENTRETIEN et CULTURE DE L'OLIVIER

### Mouche de l'olive

Les conditions climatiques sont encore favorables aux vols de mouche de l'olive, les adultes en vols sont nombreux (consultez le réseau de piégeage sur [www.afidol.org](http://www.afidol.org) rubrique Gestolive) et les larves dans les olives actives, mais la récolte approche.

*La pression de mouche reste toutefois bien inférieure à celle de l'an dernier.*

#### Destination : Olive à huile

##### 1- Vous n'avez ni pièges, ni relevé de dégâts



**Sur les zones littorales et de plaine** (en général à moins de 150 m d'altitude) : si vous le pouvez **prévoyez de récolter plus tôt que d'habitude** fin octobre ou tout début novembre, c'est la stratégie de lutte contre la mouche « Récolte précoce » décrite ci-dessous.



**Dans les zones d'arrière pays**, l'activité des mouches reste limitée, **inutile de traiter**.

##### 2- Vous faites des relevés de dégâts



- **Plus de 5-10 % d'olives avec des piqûres de pontes** : **récoltez tôt**, de préférence en octobre, et menez vos olives très rapidement au moulin, dans les heures qui suivent la récolte. Inutile de traiter.
- **Moins de 5-10 % d'olives avec des piqûres de pontes** : prévoyez une **période de récolte normale**, en fonction de l'huile que vous recherchez, il est également inutile de traiter.

##### 3- Vous avez un piège sur la parcelle

**En cas de forte augmentation du vol de mouches sur votre parcelle** : si vos captures augmentent fortement au-delà de 2 mouches par piège et par jour **prévoyez une récolte précoce** fin octobre.

Si ce n'est pas possible (récolte en novembre ou décembre) : renouvelez vos barrières minérales (argiles ou talc) ou traitez avec un adulticide préventif (liste dans Infolive précédent).



## ENTRETIEN et CULTURE DE L'OLIVIER

### Destination : olives de table

Contactez le (la) technicien(ne) référent sur votre secteur pour plus de précisions.

Les olives destinées à la table en noir, sont souvent des variétés plus grosses et plus sensibles à la mouche. Elles sont particulièrement sensibles aux piqûres de mouche. Dans les Alpes-Maritimes et la Drôme les captures de mouches sont parfois très élevées.

**Si vous avez traité la semaine dernière inutile de renouveler un traitement.**

- Sinon et si vous capturez plus d'une mouche par piège et par jour dans votre verger : **renouvelez vos barrières minérales** ou traitez avec un adulticide, (délais avant récolte de 7 jours pour les produits à base de Spinosad, deltaméthrine ou lambda-cyhalothrine).
- **Les larvicides sont à réserver aux vergers** dont les olives seront récoltées en décembre ou plus tard (olive noire de table) et ayant déjà plus de 2 % d'olives avec des trous de sortie. Dans ces cas là choisissez un larvicide curatif soit à base de
  - Diméthoate comme Danadim progress, Rogor Pipc, Rogor plus... à utiliser à la dose de 0,075 l /hl de bouillie. Délais avant récolte de 28 jours.
  - Thiaclopride comme Calypso, Casolipo, Cousto... à utiliser à la dose de 0,025 l /hl de bouillie. Délais avant récolte de 14 jours.
- Si vous n'observez pas d'augmentation des captures dans vos pièges ni de dégâts, **il est inutile de traiter.**

### Œil de paon

Inutile de traiter

*Pensez à prendre rendez-vous auprès de votre moulin*