

ENTRETIEN et CULTURE DE L'OLIVIER

Infolive n° 5 du 3 juin 2013

Toutes régions oléicoles

Œil de Paon,

ATTENTION pas de cuivre sur les fleurs

Teigne,

Traitez au stade bouton blanc, selon les terroirs, il est atteint ou dépassé !

Psylle

Des amas cotonneux peu préoccupants.



Stade E – Différentiation de la corolle

CONSULTEZ
www.afidol.org

CENTRE TECHNIQUE DE L'OLIVIER

INFOLIVE est une feuille d'information et de préconisation établie par le Centre Technique de l'Olivier pour le compte de l'Association Inter-professionnelle de l'olivier (AFIDOL). Ce document n'est pas contractuel et les informations données n'ont qu'une valeur indicative. Les informations présentés sur l'étiquette des produits ont valeur de loi.

Oeil de paon

Les dégâts sont observés sur tous les vergers insuffisamment protégés et les feuilles tombent massivement.

Pendant leurs premières semaines de vie les feuilles encore vert clair sont pas contaminées par l'œil de paon. Mais, dès qu'elles sont complètement formées, il faut les protéger.

▮ **Tous les 10 jours continuez à noter le pourcentage de feuilles avec une tache.**



Pas de cuivre sur les fleurs

Au-delà du stade bouton blanc, il ne doit plus y avoir de traitements au cuivre.

Vergers bien protégés durant le printemps (moins de 10 % de feuilles tachées) : inutile de renouveler un traitement

Vergers insuffisamment protégés durant le printemps (plus de 10-15 % de feuilles tachées)

- **si les fleurs sont ouvertes renoncez au traitement cuprique ou appliquez une spécialité** à base de Krésoxim-méthyl ou de mancozèbe (voir fiche dans Infolive n°3)
- **si les boutons floraux sont encore au stade D** une application d'un produit à base de cuivre à la demi-dose est encore possible.

Sur les vergers en retard, les arbres sont entre le stade C (formation des grappes florales) et le stade D (gonflement des boutons floraux)



Teigne de l'olive

Vous devriez connaître le pourcentage de feuilles qui étaient minées au mois d'avril (cf Infolive n°3), si ce n'est pas le cas, évaluez-le en tenant compte des feuilles déjà tombées à cause de l'œil de paon et des feuilles minées tardivement.

Vous aviez plus de 10 % de feuilles minées

- **si les fleurs ne sont pas ouvertes**, vous pouvez encore appliquer un produit à base de *Bacillus thuringiensis* (BT). Utilisez un volume suffisant de bouillie pour couvrir toute la frondaison, en cas de mauvais temps renouvelez le traitement 8 jours après le premier passage.

Matière active	Spécialités	Dose d'emploi	Zones Non Traitées
<i>Bacillus thuringiensis</i>	Bacivers, Bactura, Delfin, Dipel DF, Scutello, Xen Tari	500 g / ha	5 m

Produits autorisés en agriculture biologique

- **si les fleurs sont ouvertes**, il est trop tard pour traiter.

Vous aviez moins de 10 % de feuilles minées

- **Inutile de prévoir un traitement**

Psylle

Les amas cotonneux, bien visibles dans nos oliviers, peuvent être impressionnants mais ne justifient pas de traitements dans la majorité des cas.

Sur chaque bassin de production un réseau de techniciens peut vous aider et répondre à vos questions

PROVENCE

Groupement des oléiculteurs Hte Provence	06 79 05 22 49	M.	Siciliano
Chambre d'agriculture Alpes Maritimes	04 97 25 76 43	Mme	Damiens
CIVAM Oléicole bouches du Rhône	04 90 78 96 70	Mme	Serra-Tosio
Chambre d'agriculture du Var	04 94 99 74 07	M.	Pécout
Groupement oléiculteurs de Vaucluse	04 90 78 21 61	Mme	Casamayou

LANGUEDOC - ROUSSILLON

Chambre d'agriculture Aude	04 68 41 88 89	Mme	Agogué
Chambre d'agriculture du Gard	04 66 22 58 36	M.	Assenat
Chambre d'agriculture de l'Hérault	04 67 36 47 20	Mme	Lemoine
CIVAM Bio Pyrénées Orientales	04 68 35 34 12	Mme	Singer

RHONE-ALPES

Chambre d'agriculture de la Drôme	04 75 26 99 44	M.	Chauvin-Butheaud
-----------------------------------	----------------	----	------------------

CORSE

Chambre d'agriculture régionale de Corse	04 95 32 84 44	Mme	Ceccaldi
--	----------------	-----	----------