



INFOLIVE

ENTRETIEN et CULTURE DE L'OLIVIER

Infolive n° 23 du 15 octobre 2013

Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
Rhône-Alpes

Mouche de l'olive

L'activité des mouches baisse mais reste importante.

Evaluez la persistance d'action du dernier traitement appliqué avant d'envisager un renouvellement.

Œil de paon

Les conditions sont très favorables à la maladie mais attention aux délais avant récolte.

Maturité des olives à huile

Un retard de maturité de quelques jours.

CONSULTEZ
www.afidol.org

CENTRE TECHNIQUE DE L'OLIVIER

INFOLIVE est une feuille d'information et de préconisation établie par le Centre Technique de l'Olivier pour le compte de l'Association Inter-professionnelle de l'olivier (AFIDOL). Ce document n'est pas contractuel et les informations données n'ont qu'une valeur indicative. Les informations présentées sur l'étiquette des produits ont valeur de loi.



Région
PACA



Travaux financés par l'Union Européenne, FranceAgriMer
et l'Association Française Interprofessionnelle de l'Olive,

dans le cadre du règlement européen CE n°867/2008 du 3 septembre 2008 modifié par le Règlement (UE) N°1220/2011 du 25 novembre 2011, portant modalités d'application du règlement CE n°1234/2007



L'AFIDOL est une organisation d'opérateurs oléicoles agréée sous le numéro OPEO 2012/01

Mouche de l'olive

Observations et prévisions :




Selon les Bulletins de Santé du Végétal les conditions sont contrastées en fonction de la situation du verger, des variétés, et des méthodes de lutte mises en place jusqu'à présent. La mouche est présente à peu près partout au-dessus du seuil de risque. Les conditions climatiques annoncées devraient rester favorables à l'activité des mouches. En altitude, le froid qui cherche à s'installer peut-être un allié précieux.

Préconisation pour une récolte prévue avant le 10 novembre

Cas des vergers en zone littorale, des variétés particulièrement précoces et/ou de votre volonté d'obtenir un fruité vert marqué. Même avec un fort taux de piqûres de pontes fraîches, les dégâts n'auront pas le temps de se manifester

Quel que soit votre secteur, il est inutile de renouveler un traitement.

Préconisation pour une récolte prévue après le 10 novembre

 Récolte après le 10 novembre	Stratégie barrière 	Si les pluies ont lessivé la dernière application, renouvelez-la rapidement.
	Stratégie adulecticide préventif 	Les adulecticides sont sensibles au lessivage. Après application, ils ne sont plus efficaces si il pleut 20 mm ou après un délais de 15 jours. <ul style="list-style-type: none"> Vous avez déjà traité avec un adulecticide ? S'il a plu 20 mm ou plus, renouvelez l'application S'il n'a pas plu, inutile de renouveler. Vous n'avez pas encore traité avec un adulecticide ? Si vous capturez des mouches sur votre verger, appliquez un adulecticide.
	Stratégie larvicide curatif 	Les larvicides pénètrent dans le fruit en quelques heures, ils sont peu sensibles au lessivage, et efficace sur les jeunes larves durant 15 – 20 jours. <ul style="list-style-type: none"> Vous avez traité avec un larvicide il y a + de 15 jours ? Si le nombre d'olives avec des piqûres de ponte augmente renouvelez l'application dans la limite du nombre maximal d'application annuelle ci-dessous. Vous avez traité avec un larvicide il y a - de 15 jours ? Le larvicide est encore actif, attendez la semaine prochaine.

Respectez absolument les délais minimaux avant récolte et ne dépassez pas le nombre d'application maximal par an

	Délais avant récolte	Nombre d'applications maximal par an	Délais de Rentrée
Stratégie barrière			
ARGICAL PRO / ARGI NATURE	28 j.	6	6
SOKALCIARBO WP	3 j conseillés	6	6
Stratégie adulecticide			
KARATÉ Zéon, KARATÉ Xpress, POOL	7 j.	2	48
SYNEIS Appât	7 j.	4	6
Stratégie larvicide			
ROGOR PIPC 400, DANADIM PROGRESS	28 j.	2	48
CALYPSO / ALANTO	14 j.	2	48

Attention aux abeilles : plusieurs plantes herbacées fleurissent avec les pluies d'automne, coupez l'herbe avant de traiter.



Cas particulier : en zone d'altitude au-delà de 450 / 500 m d'altitude, si vous avez eut les premières gelées vous pouvez compter sur le froid pour stopper le développement des mouches. Dans ces cas, inutile de traiter.

Maladie de l'Œil de paon

Observations : Selon les Bulletins de Santé du Végétal les conditions sont très favorables au développement de la maladie de l'œil de paon.

Préconisations :

Si vous observez plus de 10% de feuilles tachées, appliquez un produit à base de cuivre **à la demi-dose homologuée**.

Attentions aux **délais avant récolte** des spécialités à base de cuivre
Selon les produits et fabricants ils varient entre 14 et 21 jours
(reportez vous à l'étiquette de votre produit)

Maturité des olives à huile

Les quelques analyses réalisées dans les Bouches-du-Rhône indiquent une maturité aromatique en retard d'une dizaine de jours, ainsi qu'une lipogénèse en retard d'une à deux semaines. Par ailleurs, la teneur en eau est élevée, mais cela ne tient qu'aux conditions climatiques du moment.

Globalement, il y a un certain retard, mais rien d'exceptionnel, les conditions s'approchent de celles de 2011. Si la maturité observée indique que le début de la récolte peut être positionné plus tard que d'habitude, il n'y a pas de relation à établir *a priori* avec les dates de fin de récolte, celles-ci étant basées sur la disparition des arômes, de l'ardence et de l'amertume, et sur l'accroissement des risques de gel.