

INFOLIVE

Entretien et culture de l'olivier



INFOLIVE n° 15

7 Août 2019

ISSN 2264-6701

RETROUVEZ LE BULLETIN INFOLIVE :

☞ Sur le site internet de l'Afidol : <http://afidol.org/oleiculteur/bulletins-infolive-2019>

POUR UN ABONNEMENT GRATUIT À INFOLIVE :

☞ Rendez vous à cette adresse : <http://afidol.org/lettres-dinformations>

RÉSUMÉ DE LA SITUATION

MOUCHE	On constate globalement une légère diminution des captures de mouches, à l'exception de l'arrière-pays. Les premiers trous de sortie ont été observés à proximité du littoral. Nous préconisons une application d'argile dans les parcelles qui ne sont pas déjà protégées.
DALMATICOSE	Pour limiter les risques de dalmaticose, assurez-vous d'avoir une bonne protection préventive contre la mouche.
COCHENILLE	Présence de quelques foyers localisés.
IRRIGATION	Poursuite des arrosages.

Une partie des Travaux sont financés par l'Union Européenne, l'Établissement National des Produits de l'Agriculture et de la Mer (FranceAgriMer) et l'Association Française Interprofessionnelle de l'Olive (Afidol), dans le cadre du règlement délégué (UE) n°611/2014 et du règlement d'exécution (UE) n°615/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 et du règlement (UE) n°1308/2013, en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l'Huile d'Olive et des Olives de Table.

InfOlive est une feuille d'information et de préconisation établie par le Centre Technique de l'Olivier, établissement agréé par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro LR01203, pour le compte de l'Association Française Interprofessionnelle de l'Olive (AFIDOL). Ce document n'est pas contractuel et les informations données n'ont qu'une valeur indicative, les informations présentées sur l'étiquette des produits ont valeur de loi.




FRANCE
Olive



MOUCHE

Observations * :



D'après le Bulletin de Santé du Végétal n°15 du 7 juillet 2019, la situation est globalement plutôt calme, avec une légère diminution de l'activité de la mouche sur l'ensemble du territoire, à l'exception des secteurs d'altitudes élevées (Alpes-de-Hautes-Provence, Drôme, Ardèche), où le vol de la mouche reste un peu plus marqué.

Une augmentation des piqûres est observée dans tous les secteurs. Mais les épisodes de canicule observés en juillet ont permis de limiter les développements larvaires : globalement la proportion de dégâts observés en ce moment est moindre que celle des années précédentes à la même période.

Les premiers trous de sortie sont observés sur certaines parcelles proche du littoral : Cassis (13) et Lattes (34). C'est le début de l'émergence de la deuxième génération de mouche, qui est la conséquence des attaques intervenues au début du mois de juillet.

Pourcentage de dégâts observés dans les parcelles <u>non traitées</u> du réseau d'observations, lors de la première semaine d'août.		
Années	Pourcentage d'olives piquées avec présence de larve	Pourcentage d'olives trouées
2019	1,1 %	0,0 %
2018	6,2 %	0,0 %
2017	5,5 %	3,9 %



Larves de mouches observées à Cassis (13)

Évaluation du risque :

Actuellement, le risque d'attaque est à considérer comme "*faible*" si les températures maximales se maintiennent au-dessus de 30°C, et "*moyen*" si les températures n'atteignent pas 30°C.

Mais attention ! Chaque année, à partir du 15 août, le risque d'attaque augmente fortement : soyez vigilant, et préparez dès maintenant votre stratégie de lutte en surveillant la météo, la rémanence de la dernière protection appliquée, l'importance du vol et le niveau des dégâts dans la parcelle.

☞ Préconisations :

Dans tous les secteurs, nous recommandons une protection avec de l'**argile** dans les cas suivants :

- Si la parcelle n'a pas déjà été protégée cette saison.
- Si le cumul de pluie, depuis la dernière application, dépasse 20 mm.
- Si des périodes de vents forts ont érodé la couverture minérale

Mais la vérification visuelle reste encore la meilleure méthode pour déterminer si la protection doit être renouvelée ou pas.

DALMATICOSE

Le développement de la dalmaticose étant systématiquement associé aux piqûres de ponte de la mouche de l'olive, assurez-vous d'avoir une **bonne protection préventive contre la mouche à l'aide de barrières minérales (argiles) en ce début de saison** pour limiter le risque de dalmaticose, plus particulièrement dans les vergers touchés en 2018 et sur les variétés plus sensibles (Bouteillan, Cayet Roux, Ascolana, Tanche...).

COCHENILLE NOIRE

Ponctuellement, dans certains secteurs, des foyers de cochenilles ont pu être observés. Les larves peuvent éclore jusqu'au début du mois d'août.

La taille constitue une méthode efficace et respectueuse de l'environnement pour lutter contre les cochenilles.

Aussi, des températures supérieures à 30°C sont mortelles pour les jeunes larves.

** Les observations sont réalisées dans le cadre du suivi biologique du territoire par les techniciens référents sur les départements oléicoles des régions PACA, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. Ces observations sont transcrites dans le Bulletin de Santé du Végétal (BSV) ou capitalisées lors de rencontres téléphoniques avant la rédaction de chaque bulletin Infoolive.*

Mentions réglementaires : les produits phytopharmaceutiques sont employés conformément aux règles fixées par l'arrêté du 7 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.

IRRIGATION

☞ Climat :

Au cours de la semaine écoulée, les besoins en eau des oliviers sont repartis à la hausse : les ETP moyennes ont été comprises entre 5 et 7 mm par jour selon les secteurs. Partout, les pluies ont fait défaut.

Relevés météo du 30 juillet au 4 août 2019		Vaucluse	Bouches du Rhône Ouest	Bouches du Rhône Est	Var littoral	Var Intérieur	Alpes-Maritimes	Alpes de Haute Provence	Sud Drôme / Ardèche	Gard	Hérault	Aude	Pyrénées- Orientales
Cumul en mm sur la semaine	ETP	46	51	37	34	37	34	39	44	46	45	42	43
	Pluies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETP moyenne en mm / j		6,6	7,3	5,3	4,9	5,3	4,8	5,5	6,3	6,5	6,4	5,9	6,1

ETP moyenne : évapotranspiration potentielle moyenne. Elle correspond à la consommation d'un gazon ras bien alimenté en eau (référence station météo)

Pluies : médiane des précipitations sur l'ensemble des stations météorologiques consultées. Valeurs ne tenant pas compte des pertes par ruissellement, drainage ou évaporation.

Sources données météo : CIRAME / SCP

Compte tenu de l'état de sécheresse, des **arrêtés de restriction d'usage de l'eau** ont été publiés dans les départements des Pyrénées-Orientales (plaine du Roussillon), de l'Aude (Orbieu et Agly), de l'Hérault, du Gard (aval de la Cèze et secteur du Vigan), de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône (vallée de l'Arc) et du Vaucluse : <http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp>

☞ Apports à prévoir sur un verger adulte en l'absence de précipitations :

Apports à prévoir à chaque arrosage selon le mode d'irrigation et la fréquence des arrosages		Vaucluse	Bouches du Rhône Ouest	Bouches du Rhône Est	Var littoral	Var Intérieur	Alpes-Maritimes	Alpes de Haute Provence	Sud Drôme / Ardèche	Gard	Hérault	Aude	Pyrénées- Orientales
Goutte-à- goutte	2 goutteurs / arbre Arrosage tous les 2 j (mm)	1,7	1,9	1,4	1,3	1,4	1,2	1,4	1,6	1,7	1,7	1,5	1,6
	6 goutteurs / arbre Arrosage tous les 5 j (mm)	5,3	5,9	4,2	3,9	4,2	3,8	4,4	5,0	5,2	5,1	4,8	4,9
	10 à 12 goutteurs / arbre Arrosage tous les 7 j (mm)	8,8	9,7	7,0	6,5	7,0	6,4	7,4	8,4	8,7	8,5	7,9	8,1
Micro-jet, aspersion, gravitaire Arrosage tous les 8 jours (mm)		12	13	10	9	10	9	10	12	12	12	11	11

Pour rappel, $1 \text{ mm d'eau} = 10 \text{ m}^3 / \text{ha}$ ou encore $1 \text{ litre} / \text{m}^2$. Ainsi, pour chaque arbre d'une oliveraie plantée à une distance de $6 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ (occupation au sol de 30 m^2), 1 mm représente 30 litres d'eau. Pour des arbres adultes très éloignés, prendre une valeur d'occupation du sol de 35 m^2 par défaut.

Les apports à prévoir correspondent à l'ETP entre deux arrosages, à laquelle est appliqué un coefficient propre à l'olivier et aux modalités d'irrigation (plus d'informations dans le bulletin n°14) :

Goutte-à-goutte	2 goutteurs / arbre - arrosage tous les 2 jours	Coefficient = 13 % de l'ETP
	6 goutteurs / arbre - arrosage tous les 5 jours	Coefficient = 16 % de l'ETP
	10 à 12 goutteurs / arbre - arrosage tous les 7 jours	Coefficient = 19 % de l'ETP
Micro-jet, aspersion, gravitaire - arrosage tous les 8 jours		Coefficient = 23 % de l'ETP tenant compte des pertes par évaporation

☛ **Ajustez la conduite de votre irrigation en fonction des pluies relevées au cours de la dernière quinzaine de jours :**

- pluies cumulées inférieures à 20 mm : il est préférable de ne pas modifier la conduite des arrosages par rapport aux préconisations données dans le tableau ci-dessus.
- pluies cumulées comprises entre 20 et 40 mm : réduisez les apports en eau de 10 à 20 % par rapport aux préconisations données dans le tableau ci-dessus.
- pluies cumulées supérieures à 40 mm : réduisez les apports en eau de 20 à 30 % par rapport aux préconisations données dans le tableau ci-dessus.