

INFOLIVE

Entretien et culture de l'olivier



SANS
certiphyto

INFOLIVE n° 18

28 Août 2019

RETROUVEZ LE BULLETIN INFOLIVE :

☞ Sur le site internet de l'Afidol : <http://afidol.org/oleiculteur/bulletins-infolive-2019>

POUR UN ABONNEMENT GRATUIT À INFOLIVE :

☞ Rendez vous à cette adresse : <http://afidol.org/lettres-dinformations>

ISSN 2264-6701

RÉSUMÉ DE LA SITUATION

MOUCHE Les captures sont élevées. Les dégâts continuent d'augmenter. Il est impératif que les parcelles soient protégées.

DALMATICOSE Pour limiter les risques de dalmaticose, assurez-vous d'avoir une bonne protection préventive contre la mouche.

**MALADIES
FONGIQUES** Les conditions climatiques peuvent être favorables. Il est important de rester vigilant et d'adapter sa conduite selon la météo, la sensibilité de vos variétés et la présence de symptômes dans vos vergers.

IRRIGATION Diminution des besoins en eau. Les arrosages sont à espacer.

Une partie des Travaux sont financés par l'Union Européenne, l'Établissement National des Produits de l'Agriculture et de la Mer (FranceAgriMer) et l'Association Française Interprofessionnelle de l'Olive (Afidol), dans le cadre du règlement délégué (UE) n°611/2014 et du règlement d'exécution (UE) n°615/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 et du règlement (UE) n°1308/2013, en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l'Huile d'Olive et des Olives de Table.

InfOlive est une feuille d'information et de préconisation établie par le Centre Technique de l'Olivier, établissement agréé par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro LR01203, pour le compte de l'Association Française Interprofessionnelle de l'Olive (AFIDOL). Ce document n'est pas contractuel et les informations données n'ont qu'une valeur indicative, les informations présentées sur l'étiquette des produits ont valeur de loi.



UNION EUROPÉENNE



FranceAgriMer

FRANCE
Olive



PACA




le Région
Occitanie
Pyrénées Méditerranée



MOUCHE

Observations * :



D'après le Bulletin de Santé du Végétal n°18 du 28 août 2019, les captures ont augmenté la semaine dernière et la mouche poursuit son activité avec un nombre de captures élevé en ce début de semaine. En concordance, les dégâts s'accroissent avec un pourcentage de piqûres avec développement larvaire plus important, qui s'explique par des conditions climatiques favorables à la ponte et au développement des larves de la mouche. Les pontes de ces derniers jours donneront des mouches adultes d'ici 3 à 4 semaines. Un pic de captures devrait être observé aux alentours de la mi-septembre.

Par ailleurs, l'émergence de la troisième génération de mouches se poursuit avec l'observation des premiers trous de sortie avec présence de pupes dans le Vaucluse sur Aglandau.

Évaluation du risque :

Les conditions climatiques des jours à venir restent favorables à l'activité de la mouche, aux pontes et à la transformation des œufs en larves puis en mouches adultes.

Le risque d'attaque reste inchangé à savoir : « moyen à élevé » en général et « élevé » dans les parcelles sensibles (variétés de gros calibres, irriguées, à proximité du littoral, etc).

Attention ! Chaque année, à partir du 15 août, le risque d'attaque augmente fortement : soyez vigilant, et préparez dès maintenant votre stratégie de lutte **en surveillant la météo, la rémanence de la dernière protection appliquée, l'importance du vol et le niveau des dégâts dans la parcelle.**



Larves de mouches observées à Cassis (13)

☞ Préconisations :

Dans tous les secteurs, nous recommandons une protection avec de l'**argile** dans les cas suivants :

- Si la parcelle n'a pas déjà été protégée cette saison.
- Si le cumul de pluie, depuis la dernière application, dépasse 20 mm.
- Si des périodes de vents forts ont érodé la couverture minérale

Mais la vérification visuelle reste encore la meilleure méthode pour déterminer si la protection doit être renouvelée ou pas.

DALMATICOSE

Le développement de la dalmaticose étant systématiquement associé aux piqûres de ponte de la mouche de l'olive, assurez-vous d'avoir une **bonne protection préventive contre la mouche à l'aide de barrières minérales (argiles) en ce début de saison**, plus particulièrement dans les vergers touchés en 2018 et sur les variétés plus sensibles (Bouteillan, Cayet Roux, Ascolana, Tanche...).

MALADIES FONGIQUES

☞ Observations * :

Les conditions climatiques de l'année 2019 ont été favorables au développement des maladies fongiques telles que l'œil de paon et la cercosporiose. On observe encore aujourd'hui la présence de symptômes sur les feuilles. L'inoculum reste donc présent au sein des vergers touchés.

☞ Évaluation du risque :

Les conditions climatiques des prochains jours peuvent être favorables au développement des maladies fongiques, telles que l'œil de paon et la cercosporiose.

Le risque reste faible pour l'œil de paon et moyen pour la cercosporiose.

Vous devez adapter le risque selon les conditions météorologiques auxquelles sont soumises vos parcelles, la sensibilité de vos variétés et la présence ou l'absence de symptômes observés ce printemps et en ce moment même au sein de vos parcelles.

☞ Préconisation :

Selon les conditions météorologiques que vous surveillerez attentivement, prévoyez l'éventualité d'intervenir par un traitement à base de cuivre à la dose de 1 kg/ha de cuivre-métal (dans la limite de 4 kg/ha/an de cuivre-métal, et de la dose homologuée pour le produit utilisé).

Nous vous rappelons que la couverture cuprique n'est que préventive, et qu'elle doit donc être en place au moment des conditions favorables aux contaminations.

* Les observations sont réalisées dans le cadre du suivi biologique du territoire par les techniciens référents sur les départements oléicoles des régions PACA, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon. Ces observations sont transcrites dans le Bulletin de Santé du Végétal (BSV) ou capitalisées lors de rencontres téléphoniques avant la rédaction de chaque bulletin Infolive.

Mentions réglementaires : les produits phytopharmaceutiques sont employés conformément aux règles fixées par l'arrêté du 7 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.



IRRIGATION

☞ Données climatiques :

Au cours de la semaine écoulée, les besoins en eau des oliviers ont légèrement diminué : les ETP moyennes ont été comprises entre 3,7 et 5,2 mm par jour selon les secteurs. Dans la plupart des cas, les précipitations enregistrées ont été inférieures à 10 mm. Dans ce cas, les pluies sont à considérer comme négligeables.

ETP moyenne : évapotranspiration potentielle moyenne. Elle correspond à la consommation d'un gazon ras bien alimenté en

Relevés météo du 19 août au 25 août 2019		Vaucluse	Bouches du Rhône Ouest	Bouches du Rhône Est	Var littoral	Var Intérieur	Alpes-Maritimes	Alpes de Haute Provence	Sud Drôme / Ardèche	Gard	Hérault	Aude	Pyrénées- Orientales
Cumul en mm sur la semaine	ETP	30	36	26	26	26	27	30	32	34	30	32	37
	Pluies	0	0	6	0	1	0	0	3	1	4	8	0
ETP moyenne en mm / j		4,3	5,1	3,8	3,7	3,8	3,8	4,2	4,6	4,9	4,3	4,6	5,2

eau (référence station météo)

Pluies : médiane des précipitations sur l'ensemble des stations météorologiques consultées. Valeurs ne tenant pas compte des pertes par ruissellement, drainage ou évaporation.

Sources données météo : CIRAME / SCP

Compte tenu de l'état de sécheresse, des **arrêtés de restriction d'usage de l'eau** ont été publiés dans la plupart des départements (sauf Alpes-Maritimes et Var) : <http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp>

☞ Apports à prévoir sur un verger adulte en l'absence de précipitations : compte-tenu de la diminution des besoins en eau, les arrosages sont à espacer comme suit :

Apports à prévoir à chaque arrosage selon le mode d'irrigation et la fréquence des arrosages		Vaucluse	Bouches du Rhône Ouest	Bouches du Rhône Est	Var littoral	Var Intérieur	Alpes-Maritimes	Alpes de Haute Provence	Sud Drôme / Ardèche	Gard	Hérault	Aude	Pyrénées- Orientales
Goutte-à- goutte	2 goutteurs / arbre Arrosage tous les 3 j (mm)	1,7	2,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,7	1,8	1,9	1,7	1,8	2,0
	6 goutteurs / arbre Arrosage tous les 7 j (mm)	4,9	5,7	4,2	4,1	4,2	4,3	4,8	5,1	5,5	4,8	5,1	5,8
	10 à 12 goutteurs / arbre Arrosage tous les 9 j (mm)	7,4	8,7	6,4	6,3	6,4	6,6	7,3	7,8	8,4	7,3	7,8	8,9
Micro-jet, aspersion, gravitaire Arrosage tous les 10 jours (mm)		10	12	9	9	9	9	10	10	11	10	11	12

Pour rappel, 1 mm d'eau = 10 m³ / ha ou encore 1 litre / m². Ainsi, pour chaque arbre d'une oliveraie plantée à une distance de 6 m x 5 m (occupation au sol de 30 m²), 1 mm représente 30 litres d'eau. Pour des arbres adultes très éloignés, prendre une valeur d'occupation du sol de 35 m² par défaut.

Les apports à prévoir en micro-jet sont fixés pour du matériel avec une portée de jet d'1,5 mètre (tache humide de 3 mètres de diamètre). En cas de portée inférieure, le volume d'eau apporté doit être revu à la baisse, ce qui est compensé par des arrosages plus rapprochés.

Les apports à prévoir correspondent à l'ETP entre deux arrosages, à laquelle est appliqué un coefficient propre à l'olivier et aux modalités d'irrigation (plus d'informations dans le bulletin n°14) :

Goutte-à- goutte	2 goutteurs / arbre - arrosage tous les 3 jours	Coefficient = 13 % de l'ETP
	6 goutteurs / arbre - arrosage tous les 7 jours	Coefficient = 16 % de l'ETP
	10 à 12 goutteurs / arbre - arrosage tous les 9 jours	Coefficient = 19 % de l'ETP
Micro-jet, aspersion, gravitaire - arrosage tous les 10 jours		Coefficient = 23 % de l'ETP tenant compte des pertes par évaporation



☞ **Ajustez la conduite de votre irrigation en fonction des pluies relevées :**

- pluies cumulées inférieures à 10 mm : ces pluies sont trop faibles pour avoir une réelle incidence sur l'alimentation des arbres. Il est préférable de ne pas modifier la conduite des arrosages.
 - pluies cumulées comprises entre 10 et 20 mm : ces pluies ont légèrement contribué à l'alimentation des arbres. Réduisez les apports en eau de 20 à 30 % par rapport aux préconisations données dans le tableau ci-dessous.
 - pluies cumulées comprises entre 20 et 40 mm : ces pluies profitent grandement aux oliviers. Réduisez les apports en eau de 50 % par rapport aux recommandations données ci-dessous.
-