



## A retenir

### OLIVIER

























**Stades phénologiques :** Les olives continuent leur croissance. Apparition des premières olives fripées.

**Mouche de l'olive :** Conditions climatiques favorables. Captures stables voire en baisse mais elles restent élevées. Dégâts observés stables. Le risque reste élevé.

**Dalmaticose :** Des dégâts sont observés sur l'ensemble des secteurs. Risque corrélé au risque mouche de l'olive.

## MÉTÉO

### • Prévisions (Source Météo France)

Département / Jour	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun
<b>Gard</b>						
<b>Hérault</b>						
<b>Aude</b>						
<b>Pyrénées-Orientales</b>						

Des épisodes orageux sont annoncés sur le Gard, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Ils seront accompagnés par des taux d'humidité importants et une chute des températures.

De manière générale, les températures sont en augmentation pour cette fin de semaine avec des valeurs régulièrement supérieures à 35°C et pouvant monter jusqu'à 38°C.

## OLIVIER

### • Stades phénologiques – Symptômes physiologiques

Nous avons atteint le stade BBCH 75 sur l'ensemble des secteurs : Les fruits ont atteint 50% de leur taille finale, les noyaux sont durs. Les fruits continuent leur croissance.

L'avancement de la phénologie est plus précoce que 2019 : environ 10 à 12 jours d'avance.

Les premières olives fripées sont observées en vergers non irrigués.



Olives fripées

Crédit Photo : France Olive



Directeur de publication :

Denis CARRETIER  
Président de la Chambre  
Régionale d'Agriculture  
d'Occitanie  
BP 22107  
31321 CASTANET  
TOLOSAN Cx  
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :  
Chambres d'agriculture du  
Gard, de l'Hérault et du  
Roussillon, Chambre  
régionale d'Agriculture  
d'Occitanie, DRAAF  
Occitanie, France Olive,  
SUDEXPE



Action du plan Ecophyto  
pilotee par les ministères en  
charge de l'agriculture, de  
l'écologie, de la santé et de la  
recherche, avec l'appui  
technique et financier de  
l'Office français de la  
Biodiversité

## • Mouche de l'olive

- ✓ **Attractivité des olives** : Tous les éléments qui favorisent la production d'olives de gros calibre maintiennent une attractivité élevée des olives (irrigation, faible charge, etc).
- ✓ **Conditions météorologiques** : Bien qu'une augmentation des températures soit prévue, les épisodes orageux auront tendance à diminuer ponctuellement les températures au sein des vergers.

**Les moyennes journalières restent favorables à l'activité de ponte de la mouche et à la transformation de l'œuf pondu en mouche adulte.**

- ✓ **Évolution de la population** : L'évolution de la population de mouches est connue grâce au réseau de pièges sexuels ou alimentaires mise en place sur l'ensemble du territoire oléicole. Vous pouvez consulter la carte des captures sur [le lien ICI](#).

Sur l'ensemble des secteurs, **les captures enregistrées ces derniers jours ont tendance à diminuer**. Toutefois, le **niveau de captures reste élevé** sur la majorité des secteurs.

- ✓ **Dégâts observés** : Ils dépendent de la conduite menée sur les vergers :
  - Avec méthode de lutte : le taux d'olives piquées est maîtrisé.
  - Sans méthode de lutte : évolution importante du taux d'olives piquées.

Les premiers trous de sortie ont été observés dans l'Aude (parcelle conventionnelle, Lucques).

**Sur les vergers avec une méthode de lutte à jour, l'évolution des dégâts est faible.**







Symptômes visibles de l'évolution d'une piqûre de mouche : de gauche à droite, piqûre de ponte, galerie larvaire, trou de sortie  
Crédit photo : France Olive

**Évaluation du risque:** Il doit être évalué selon les caractéristiques **favorables** ou **défavorables** à la mouche de l'olive de votre parcelle:

- la sensibilité de votre parcelle (variété **peu sensible** / **sensible, sec** / **irrigué**, environnement proche, ...),
- l'activité de la mouche (**Absence** / **Présence** de captures au niveau des pièges),
- l'évolution des dégâts sur olives (**stable** / **en augmentation**),
- votre protection (**à jour, à renouveler**, ...),
- les prévisions météo (Température **chaude** / **froide, Pluie**)
- la destination de vos olives (**Huile** ou **Table**)
- le risque que vous êtes prêt à prendre.

En résumé, le risque de la semaine est présenté dans le tableau ci-dessous :

	<b>Vergers sensibles</b> (irrigué, variété précoce et de gros calibre, faible charge en fruits, zone littorale)	<b>Vergers moins sensibles</b> (non irrigué, variété tardive et de petit calibre, forte charge en fruits, zone de plaine ou d'altitude)
Capture de mouches	<b>Risque élevé</b> 	<b>Vigilance renforcée</b> 
Aucune capture de mouche	<b>Vigilance renforcée</b> 	<b>Vigilance renforcée</b> 

## • Dalmaticose

Le développement de la dalmaticose est fortement corrélé à la présence de piqûres de mouche sur les olives.

Des taches de dalmaticose sont observées sur l'ensemble des secteurs : le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

### Évaluation du risque :

Le risque est fortement corrélé au risque de piqûres de mouche.



Le risque est plus élevé dans les cas suivants :

- parcelle sensible à la mouche de l'olive (irriguée, variété sensible, etc),
- parcelle non protégée contre les piqûres de mouche de l'olive,
- parcelle déjà sujette à des symptômes de dalmaticose les années précédentes.



Symptômes sur fruits caractéristiques de la dalmaticose - Photo France Olive

### REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Le bulletin de santé du végétal a été préparé :

- **pour les filières des fruits à pépins et noyau** : par l'animateur filière de la chambre de l'Hérault et élaboré sur la base des observations réalisées par le CETA du Vidourle, les Chambres d'agriculture de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, Cofruid'Oc et SudExpé.

- **pour la filière Olive** : par l'animateur filière de France Olive et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'agriculture de l'Aude, CivamBio 66 et le GE des coopératives oléicoles 30 et 34.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.